

ชื่อเรื่อง	การคัดแยกยีสต์ และแบคทีเรียกรดแลกติกจากกล้าเชื้อลูกแพ้ง้ำหวาน ในการทำขนมถั่วยฟูพื้นบ้าน
ผู้เขียน	นางสาวสุธิรา ศรีสุข
สาขาวิชา	วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ
ปีการศึกษา	2554

บทคัดย่อ

การผลิตขนมถั่วยฟูพื้นบ้าน มีวัตถุคุณในการผลิตที่สำคัญ ได้แก่ แพ้ง้ำเจ้า น้ำตาล โตนด และลูกแพ้ง้ำหวาน เมื่อเก็บตัวอย่างลูกแพ้ง้ำหวาน จำนวน 3 ตัวอย่างจากอําเภอต่างๆ ในจังหวัดปัตตานี ได้แก่ อําเภอโคโพร์ อําเภอบะหริ่ง และอําเภอสายบุรี เพื่อผลิตเป็นกล้าเชื้อ หลังจากนั้นนำกล้าเชื้อที่ได้ใช้ในการผลิตขนมถั่วยฟูพื้นบ้าน โดยทำการหมักไว้ที่อุณหภูมิห้อง (30 ± 1 องศาเซลเซียส) และ 35 องศาเซลเซียส พบร่วมกับ 1.46 ลูกบาศก์เซนติเมตร/กรัม ที่อุณหภูมิ 35 องศาเซลเซียสเป็นเวลา 4 ชั่วโมง และใช้ระยะเวลาสั้นกว่า การหมักที่อุณหภูมิห้อง โดยมีปริมาตรการขึ้นฟูเท่ากับ 1.07 ลูกบาศก์เซนติเมตร/กรัม ในชั่วโมงที่ 5 เมื่อคัดแยกยีสต์และแบคทีเรียกรดแลกติกจากแพ้งในระหว่างการหมักเพื่อผลิตขนมถั่วยฟูจากกล้าเชื้อที่ใช้ลูกแพ้ง้ำหวานจากอําเภอบะหริ่ง และหมักอุณหภูมิ 35 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 4 ชั่วโมง พบร่วมกับ ยีสต์ ไอโซเลท Y03 มีความสามารถในการผลิตก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ และความสามารถในการทนกรด ได้ เมื่อนำไปจำแนกพบว่าเป็นยีสต์สายพันธุ์ *candida tropicalis* ขณะที่แบคทีเรียกรดแลกติก ไอโซเลท L02 มีความสามารถในการผลิตกรดแลกติก และเจริญได้ดีในสภาพที่มีอุณหภูมิ เมื่อนำมาจำแนกพบว่าเป็นแบคทีเรียกรดแลกติกสายพันธุ์ *Lactobacillus plantarum* เมื่อนำยีสต์และแบคทีเรียกรดแลกติกทั้ง 2 สายพันธุ์ เป็นกล้าเชื้อบริสุทธิ์ในการผลิตขนมถั่วยฟู พบร่วมกับ ผลิตภัณฑ์จากกล้าเชื้อบริสุทธิ์มีปริมาตรการขึ้นฟูเท่ากับ 1.40 และ 1.45 ลูกบาศก์เซนติเมตร/กรัม ที่ อุณหภูมิ 30 ± 1 และ 35 องศาเซลเซียส ตามลำดับ โดยเฉพาะมีการใช้ระยะเวลาในการหมักเพียง 3 ชั่วโมงเท่านั้น

คำสำคัญ : ยีสต์, แบคทีเรียกรดแลกติก, ขนมถั่วยฟู, ปริมาตรการขึ้นฟู, กล้าเชื้อ

Thesis Title	Isolation of Yeast and Lactic Acid Bacteria from Starter Culture (Loog-pang Khaomak) for Traditional Ka-Nom Tuay-Fu Production
Author	Miss Suteera Srisuk
Major Program	Food Science and Nutrition
Academic Year	2011

ABSTRACT

Tradition Ka-Nom Tuay-Fu Production composed of the raw materials as rice flour, palm syrup and Loog-pang Khaomak. Three samples of Loog-pang Khaomak were obtained from Amphur Khokpho, Yaring and Sayburi in Pattani provinces and used as a starter in Ka-Nom Tuay-Fu production. Effect of fermentation at room temperature ($30 \pm 1^\circ\text{C}$) and 35°C on the quality changes of Ka-Nom Tuay-Fu from different areas was investigated. Ka-Nom tuay-Fu made from Amphur Yaring's starter was fermented at $30 \pm 1^\circ\text{C}$ and 35°C had volume capacity than those from other starter. It found that Ka-Nom Tuay-Fu from Amphur Yaring's starter was the highest of volume capacity about $1.46 \text{ cm}^3/\text{g}$ at 35°C for 4 h and the time of fermentation was lower than at room temperature. It was volume capacity about $1.07 \text{ cm}^3/\text{g}$ for 5 h. To isolate of yeast and lactic acid bacteria form Ka-nom Tuay-Fu from Amphur Yaring's starter at 35°C for 4 h was isolate yeast Y03 which it has the highest a gas production, and good acid tolerance. The identification result indicated isolate were *Candida tropicalis* whereas, lactic acid bacteria isolate L02 can produce lactic acid and well grow on the ethanol condition. The identification result indicated that the isolate was *Lactobacillus plantarum*. When using both of strains as a pure culture starter for Ka-num Tuay Fu production. It was found that the product from a pure culture starter have a volume capacity about 1.40 and $1.45 \text{ cm}^3/\text{g}$ at room temperature ($30 \pm 1^\circ\text{C}$) and 35°C , respectively. Especially, it was using only 3 h for fermentation.

Keywords : Yeast, Lactic Acid Bacteria, Ka-Nom Tuay-Fu, volume capacity, starter culture